

ASSIST - IMPLEMENTATION IN BELGIUM



ASSIST implementation in Belgium

- Different settings:
- GP's: a pencil paper version of ASSIST and an online instrument was developed, we are now developing a new online version, that can be used in e-Health software
- A&E: a self-administered (tablet) version of the instrument was developed and tested, ... results next INEBRIA-conference?



Barriers encountered in SBIRT implementation in Belgium

- Time constraint
- Lack of knowledge and confidence
- Role inadequacy
- Lack of clinical leadership
- Problems with privacy



Overcoming some barriers with an electronic ASSIST?

- Time constraint: less time needed (score, advice and referral addresses can be automated, self-administered version?)
- Lack of knowledge and confidence:
 we can provide extra info to GP's and
 A&E workers, such as FRAMES,
 patient brochures, ...



Overcoming some barriers with an electronic ASSIST?

- Problems with privacy: for example A&E boxes with curtains between patients,...
- Role inadequacy: PHC workers in Belgium didn't see it as their task to screen and provide feedback (selfadministered version?)



Different trials:

- GP's: first questionnaire format with automated score,...
- Problems: GP's didn't found the questionnaire (other website), no link with electronic patient record, lack of resources
- Solution: website format that can be linked to GP's own software, with more resources and ready for e-health software



Different trials:


- A&E self administered version of ASSIST on a tablet:
 - advice and feedback mailed to the patient
 - opportunity to follow online self-help modules on alcohol, GHB, cannabis and cocaine
 - possibility to receive addresses of alcohol and drug centers in their mailbox
 - booster mails ...




Why an electronic intervention?

- -limited investment of staff
- privacy of users
- no specialized training necessary
- users like internet based interventions

-...









Screening

- ASSIST (5 10 minutes)
- Examples and explanations are provided in the instrument, but could be unclear
- Start screening



Welke van de volgende middelen hebt u ooit gebruikt in uw leven?

Het gaat hier enkel over niet-medisch gebruik.

- Gebruik van middelen die niet door een arts voorgeschreven werden
- Gebruik van medicatie op voorschrift in grotere hoeveelheden, frequenter of op een andere manier dan voorgeschreven
- Gebruik met een andere intentie dan de bedoeling was.

Verder lezen»

1	/ Tabaksproducten	voorbeelden
1	Alcoholische dranken	voorbeelden
1	Cannabis	voorbeelden
•	Cocaîne	voorbeelden
	Stimulerende middelen type amfetamine	voorbeelden
Ī	Vluchtige snuifmiddelen/inhalanten	voorbeelden
Γ	Slaap- en kalmeringsmiddelen	verbergen x
	Benzo's; Lexotan®, bromazepam; Rohypnol®, flunitrazepam; Stilnoct®, zolpidem; lorazepam; Tranxene®, clorazepaat; Valium®, diazepam; Xanax®, alprazolam etc.	
Ţ	Hallucinogenen	voorbeelden
	Opiaten	voorbeelden
Г	GHB	voorbeelden
	Andere	



Results:

- Automated scores
- Each product group will give a score
- Three possible scores:
 - Low risk
 - Medium risk
 - High risk
- Depending on the risk level, different web application









Bedankt

De vragenlijst is voltooid. Wij bedanken je voor je medewerking, hieronder vind je de resultaten. De resultaten worden je ook doorgemaild. Ze worden niet opgeslaan op deze PC en kunnen ook niet geraadpleegd worden door het medsich personeel. Mocht je je echter ongerust maken over de resultaten van je gebruik mag je de arts hierover steeds aanspreken of kan je bellen naar de druglijn.

Score: Hoog

Als gevolg van je huidig gebruik van tabaksproducten en cannabis, loop je een hoog risico op ernstige problemen (gezondheid, sociaal, financieel, gerechtelijk, relatie). Je zal misschien reeds een aantal van deze problemen zelf ervaren hebben.

Er is een grote kans dat je jou gebruik niet meer onder controle hebt of in de nabije toekomst problemen zal ervaren.

Uw risico om problemen te ondervinden met

Tabaksproducten

Regelmatig roken kan leiden tot:


- Vroegtijdig verouderen, rimpelen van de huid
- Luchtweginfecties en astma
- Hoge bloeddruk, diabetes
- Bij roken in het bijzijn van uw kinderen: luchtweginfecties, allergieën en astma
- Miskramen, vroegtijdige geboorte en baby's met laag geboortegewicht bij zwangere vrouwen
- Nierziekten
- Chronische obstructieve luchtwegaandoeningen
- Hartziekte, beroerte, vaatziekten Kankers




Om bovenstaande risico's te vermijden zou je best minder gebruiken of (een tijdje) stoppen met gebruik. Deze beslissing dien jij echter voor jezelf te nemen.



Results eSBIRTes:













VAD

Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

Belgium

Tel: +32 02 423 0333 Fax: +32 02 423 0334



Eötvös Lorand University (ELTE)

Egyetem tér 1-3 H-1053 Hungary

Budapest

Tel: +36 1 461 2600 Fax: +36 1 461 2695

Centre for Public Health Liverpool

John Moores University 2nd Floor, Henry Cotton Campus 15-21

Tel: +44 151 231 4453 Fax: +44 151 231 4552



IREFREA

Rambla, 15 2o, 2a, 07003 Palma de Mallorca

Tel: +34 97 172 7434 Fax: +34 97 121 3306



Trimbos Institute

Da Costakade 45 P.O. Box 725 3500 AS Utrecht The Netherlands

Tel: +31 30 297 1100 Fax: +31 30 297 1111